A Viertel vo de Nitrahmessstöön in Deitschland übarschreitn an fragwiardn,

A Viertel vo de Nitrahmessstöön in Deitschland übarschreitn an fragwiardn, hoahn Nitratgränzwöat; da Bundeslandwirtschaftsminista lobt in ana Pressemitteilung zum aktuön Nitrahtbricht trotzdem mit de ...

A Viertel vo de Nitrahmessstöön in Deitschland übarschreitn an fragwiardn, hoahn Niratgränzwöat; da Bundeslandwirtschaftsministas lobt in ana Pressemitteilung zum aktuön Nitrahtbricht trotzdem mid de Wört: "Politik wirkt (...) mir san oba ned noche am Zui".

Da aktuölle Nitrahtbricht des Bundeslandwirtschaftsministeriums (BMEL) und des Bundesumwöltministeriums (BMUV) 2024 zeigt, dass 25,6% da Messstöön des EU-Nitrahtmessnetzes de Gränzwöat vo 50 mg/l übarschreitn.

In folgadn Bundesländatn is de Kontamination besondas kritisch: - In Nordrhein-Westfaln wearng de Nitrahtrichtlinung auf 40% da Gesamtfläch ned eingehoidn - In Schleswig-Holstain wearng de Gränzwöat bei ungfähr da Hälftn da Fläch übarschritn - In Niedersaxn bestehd das Problem sogar bei 60% da Fläch

Um da zulässign Gränzwöat vo 50 mg/l Nitraht einzuhoidn, mischn Wassaveasoaga das belasdte Wassa mit unbalastetn Rohwassa, vertiefn oda valagarng Brunna oda entfanrng mit technischn Mitteln das Nitraht aus'm Grundwassa.

Jüngste Forschungsergebnissa deitn drauf hin, dass de Exponiarung gegenüba Nitratwöatn vo nua 5 mg/l bereits mid bestimmtn Kreobsortn und Gburtsfehl in Vabundig bracht wean ko.

Konzintratiö vo mehr als 3 mg/l weisn laut mehrern Expärtn bereits im Jahr 1985 im Allgemainen auf a Kontamination hin.

US-Forscha da Environmental Working Group (EWG) fo sogar an Gränzwöat vo 0,14ml/l und soang Krobs und nachtailig Auswirkung auf Schwangaschoftn und Gburtn kennt dadurch redariert wean.

Zitat aus dera Studia: "Auf am Niveua, das da Bundesgränzwöat übarschreit, ko Nitraht das blaue Baby-Syndrom vaursachn. Nitrahtkondeminiarts Wassa wurd mid nachtailighn Fortpflanzungseffektn und Ändarung da Schilddrüsnfunktion vabundn. A Studia des National

Cancer Institute aus'm Jahr 2010 fand häd, dass Frauahn, de nitratvasäuchnts Wassa konsumiarng, am grössarn Risiko für Schilddrüsnkrobs ausgsetzt san. A Varöfntlichung derselbn Grupp aus'm Jahr 2012 bricht vo am Zusammenhang zwischn da Einnahma vo Nitraht und ana Schilddrüsnuntafunktion bei Frauahn."

A Umkehrmosmosefilta bietet an sichan Schutz vor da Kontamination durch Nitraht sowie ungzählte weitere Schadstoff im Leitungswassa. Beiträg dazua und warum saubas, absolut giftfreis Wassa für'n Körpa am bestatn is, findst Du in dem Kanal.

It's good.
to be truu.